



Diagnostik und Therapie früher und fortgeschrittenener Mammakarzinome

©AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

Prognostische und prädiktive Faktoren

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

Prognostische und prädiktive Faktoren

- **Versionen 2002–2022:**

Costa / Fasching / Fersis / Friedrichs / Gerber / Göhring / Harbeck / Jackisch / Janni / Kolberg-Liedtke / Kreipe / Loibl / Lück / Mundhenke / Nitz / Rody / Schaller / Schmidt / Schmutzler / Schneeweiss / Simon / Solomayer / Thill / Thomssen / Untch / Witzel / Wöckel

- **Version 2023:**

Gluz / Witzel

www.ago-online.de

**FORSCHEN
LEHREN
HEILEN**



©AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

Definition

Prognostische Faktoren

Dienen der Vorhersage des wahrscheinlichen weiteren Krankheitsverlaufs (z. B. krankheitsfreies oder progressionsfreies Überleben, Gesamtüberleben). Die Vorhersage kann durch Therapie beeinflusst werden.

Prädiktive Faktoren

Dienen der Vorhersage eines wahrscheinlichen Therapieeffektes.



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN

**“Low absolute risk implies
low absolute benefit”**

Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG), Lancet 379: 432-444, 2012



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN

Quality Criteria

- **Biological hypothesis**
- **Simple and standardized assessment method, quality assurance (QA) of the test**
- **Prospectively planned statistical evaluation (primary goal)**
- **Validation of clinical significance according to**
 - „Oxford Level of Evidence (LoEOx2001)“ criteria and „Grades of Recommendation (GR)“
 - „Grades of Recommendation (GR)“ as well as modified LoE criteria for the use in archived specimen (LoE2009) and category of tumor marker study (CTS)
- **Clinical relevance for treatment decisions**

Frühes Mammakarzinom (M0) - eBC

Prognosefaktoren I

Faktor	Oxford		
	LoE	GR	AGO
■ Tumorgröße - pT	1a	A	++
■ Lymphknotenstatus - pN	1a	A	++
■ Histologischer Typ (muzinös, tubulär etc.)	2b	B	++
■ Grading (Elston & Ellis) - G	2a	B	++
■ Alter	2a	B	++
■ Histologisch nachgewiesener Einbruch in Lymph- und/oder Blutgefäße (L1, V1)	1b	B	++
■ pCR nach NACT* bei (Lum B-like, HER2+, TN)	1a	A	++
■ Erhöhtes Rezidivrisiko bei initial invas.-lob. Typ, cT3/4, N+	2a	B	+/-
■ Übergewicht (BMI > 30 kg/m ²)	1b	B	+
■ Resektionsstatus - R0 / R1	1a	A	+

* NACT = Neoadjuvante Chemotherapie



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN

Frühes Mammakarzinom (M0) – eBC

Prognosefaktoren II

Faktor

- ER / PR
- HER2 (IHC, ISH)
- ER / PR / HER2 / Ki-67 zur Abschätzung des intrinsischen Typs unter Berücksichtigung der Tumорhistologie und -biologie
- Proliferationsmarker
 - Ki-67 vor, während oder nach der Behandlung
 - Neu-Bestimmung Ki-67 nach kurzer, präoperativer endokriner Therapie (2 Wochen) (ypT und ypN)*

Oxford

Faktor	Oxford		
	LoE	GR	AGO
▪ ER / PR	1a	A	++
▪ HER2 (IHC, ISH)	1a	A	++
▪ ER / PR / HER2 / Ki-67 zur Abschätzung des intrinsischen Typs unter Berücksichtigung der Tumорhistologie und -biologie	2b	B	++
▪ Proliferationsmarker <ul style="list-style-type: none">▪ Ki-67 vor, während oder nach der Behandlung▪ Neu-Bestimmung Ki-67 nach kurzer, präoperativer endokriner Therapie (2 Wochen) (ypT und ypN)*	1a	B	+
	1a	B	+

*Biomarkertestung und Genexpressionstest sollten an Stanze vor Therapie bestimmt werden

Reproducibility – Quality Assurance is Key for Clinical Decision Making

- ER / PR: concordance central vs. local is high (97%; Plan B, SABCS 2014)
- Grade: concordance central vs. local is 68% (PlanB, JCO 2016)
- HER2: frequency of false-positive test results 6% (ASCO /CAP JCO 2013)
- Impact of routine pathologic review in N0 BC: 20% changes: grade 40%, LVI 26%, N 15%, margin 12% (JCO 2012)
- pN0 from MIRROR study: pN0 was upstaged in 22%, in central pathology review (Ann Oncol 2012)
- Ki-67:
 - Inter- and intraobserver variability in measurement of Ki-67 is high (J Nat. Cancer Institute 2011)
 - High reproducibility for low and high Ki-67 levels (J Pathol 2002)
 - Standardized methodology improves analytical validity (JNCI 2020)

Frühes Mammakarzinom (M0) – eBC

Prognosefaktoren III

Faktor	Oxford			
		LoE	GR	AGO
▪ Genexpressionsprofile (GEP; Multigene Assays, Gensignaturen)				
▪ MammaPrint® (N0-1)	1b	A	+*	
▪ Oncotype DX® (N0-1, HR+, HER2-)	1b	A	+*	
▪ EndoPredict® (N0-1, HR+, HER2-)	2b	B	+*	
▪ Prosigna® (N0-1, HR+, HER2-)	2b	B	+*	
▪ Breast Cancer Index® (N0-1, HR+ HER2-)**	2b	B	+/-*	
▪ IHC4 (ER / PR / HER2 / Ki67) (für die zentrale Testung validiert)	2b	B	+/-	
▪ PREDICT® Algorithmus (https://breast.predict.nhs.uk/)	1b	A	+	
▪ Klinisch-pathologischer Score für lobuläres Mammakarzinom (Nodalstatus, Tumorgröße, Lymphgefäßinvasion LVI)	2b	B	+/-	
▪ CTS5 Clinical Treatment Score**	2b	B	+	
▪ CPS-EG Score	2b	B	+	
* Sollten nur im Kontext der klinisch-pathologischen Faktoren (Tumorgröße, Nodalbefall, Grading, Ki-67, ER, PR, HER2) eingesetzt werden				
** Abschätzung des Spätrezidiv-Risikos				

Frühes Mammakarzinom (M0) – eBC

Prognosefaktoren IV

Faktor	Oxford		
	LoE	GR	AGO
■ Disseminierte Tumorzellen (DTC, im Knochenmark)	1a	A	+/-
■ Zirkulierende Tumorzellen (CTC, im Blut, Cell Search®)	1b	A	+/-
■ CTC vor NACT (in Bezug auf OS, DDFS, LRFI)	1b	B	+/-
■ Therapieentscheidungen basierend auf CTC-Phänotypen	3a	C	-
■ Cell-free DNA (cfDNA, im Blut, für DFS, PFS, OS)	2a	B	+/-

* Validierte klinische Daten nur verfügbar für diesen Assay

Commercially Available Molecular Tests

	70 gene signature (MammaPrint®) \$	21 gene Recurrence score (Oncotype DX®) \$	8 gene signature (Endopredict®) \$	PAM 50 (Prosigna®) \$	Breast Cancer Index® (BCI) \$
Provider	Agendia	Genomic Health	Sividon (Myriads)	NanoString	Biotheranostics
Type of assay	70-gene assay	21-gene recurrence score	11-gene assay	50-gene assay	5 + 2 (MGI+H/I)
Type of tissue	fresh frozen (technical validation for FFPE available)	FFPE	FFPE	FFPE	FFPE
Technique	Microarrays for RNA	qRT-PCR	q-RT-PCR	Direct hybridization (nCounter®)	q-RT-PCR
Central lab	yes	yes	no	no	yes
Indication and population studied	prognostic N-/, < 70 Jahre	prognostic N-/, ER+ endocrine treated	prognostic (pre-) postmenopausal N-/, ER+ HER2- endocrine treated	prognostic postmenopausal N-/, ER+ HER2- endocrine treated	Prognostic pT1-3pNo – pN1 ER+ / HER2- Endocrine treated
Risk classes	Low – high	RS (Low – intermediate – high)	Low – high	ROR (Low – intermediate – high), molecular types	Low - high
Clinical Validation	Yes	yes	yes	yes	Yes
Registration	FDA clearance as "In Vitro Diagnostic Multivariate Index Assay (IVDMIA)" CE-Mark (fresh tissue and FFPE)	Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) + College of American Pathologists (CAP)- accredited ref lab	CE-Mark	CE-Mark FDA 510(k) Clearance	Service Mark (SM)

\$ Validated clinical data only available for this assay

Commercially Available Molecular Tests

	70 gene signature (MammaPrint®) \$	21 gene Recurrence score (Oncotype DX®) \$	8 gene signature (Endopredict®) \$	PAM 50 (Prosigna®) \$	Breast Cancer Index® (BCI)
Prognosis after 5 yrs (late recurrences)	not separately shown	yes	yes	yes	yes
Predictive impact (chemotherapy benefit)	poorly validated	yes	not shown	not shown	EAT after 5 yrs
Prospective-retrospective evidence (% of recruited patients)	Multicenter validation	NSABP B-14 (14%) NSABP B-20 (28%) ECOG 9127 SWOG 8814 (40%) ATAC (30%)	ABC6 6 (19%) ABC6 8 (36%) GEICAM-9906 (45%) ATAC (10%)	MA.12 (59%) MA.5 (66%) ABC6 8 (44%) ATAC (16%)	TransATTOM (11%)
Prospective evidence	MINDACT (N0, N1) (8y DFS, OS)	TAILORx (12 y DFS, OS), N0, RS ≤ 25 vs. ≥ 26 PlanB (N0 highrisk/N+) (5 y DFS, OS) RxPONDER (5 y DFS, OS), N1, RS ≤ 25 vs. ≥ 26 ADAPT (5 y DFS, OS), N0-1, RS 0-11; RS 12-25 / Ki67 response	—	—	--

\$ Validated clinical data only available for this assay

Prospective Clinical Trials (Oncotype DX® [TAILORx, PlanB, RxPONDER, ADAPT], MammaPrint® [MINDACT])

Prognosis in low-risk groups excellent for both tests: ~ 94% 5 J. DFS with only adjuvant endocrine therapy (ET)

	TailorX	RxPONDER	PlanB	ADAPT	MINDACT
Follow-up	median 7.5 years	median 5.1 years	5-year-DFS	median 60 months	median 8.7 years
Trial design (biomarker question)	pN0; Randomization RS 11-25 (+/- CTX)	pN1; Randomization RSO-25 (+/- CTX)	Prospective ODX testing: ET alone in RS 0-11 pN0-1	Non-inferiority (iDFS) ET alone: RS 0-11 vs RS12-25/ET response	Prospectively defined 5y-DMFS threshold for ET alone
Percentage clinically defined low-risk group	6615/9427 (70.2%, adj-online)	all 1-3 involved lymph nodes	all clinical CTX indication (pN0-1)	all clinical chemotherapy (CTX) indication (c/pN0-1)	3336/ 6693 (49.8%, adj-online)
Percentage high clinical risk and low genomic risk (clinical CTX indication)	16.7% (RS 0-10)	42.8% (RS 0-13)	15.3% (RS 0-11)	ET-trial (pN0-1): all RS 0-25, i.e. low genomic risk with ET alone	23.2% (high clinical/low genomic risk)
Test failure rate	n.r.	n.r.	2.9%	n.r.	26% (fresh frozen)
Percentage genetically intermediate-risk group (only for Oncotype DX, ODX)	69.1% (RS 11-25)	57.2% (RS 14-24)	60.4% (RS 12-25)	Included only RS 0-11 (37.9%) or RS 12-25/ET response (62.1%)	n.a.
Percentage genetically high-risk group (only for Oncotype DX)	14.3% (RS ≥ 26)	n.a.	24.3% (RS ≥ 26)	n.a.	27.0% (high clinical <u>and</u> high genomic risk)
12-year follow-up	reported	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.

Adjuvante Endokrine Therapie

Prädiktive Faktoren für DFS

Oxford				
Therapie	Faktor	LoE	GR	AGO
• Endokrine Therapie	ER / PR Status [%]	1a	A	++
	IHC Färbeintensität (ER/PR)	1a	A	-
	Neu-Bestimmung Ki-67 nach kurzer, präoperativer endokriner Therapie (2-4 Wochen) (ypT und ypN)	1b	A	+
• Erweiterte endokrine Therapie (EAT)	Breast Cancer Index® MammaPrint	2b	B	+/-
• Tamoxifen	CYP2D6 Polymorphismus	2b	B	-
• Ovarieller Ablation oder Funktionsunterdrückung	Menopausenstatus	1c	A	++
• Aromataseinhibitoren vs. Tamoxifen	Menopausenstatus	1c	A	++
	ER / PR / HER2 als Einzelmarker	1c	A	-
	Invasives lobuläres MaCa	2b	B	+
	Ki-67 hoch	2b	B	+/-
	Übergewicht (BMI > 30 kg/m ²)	2b	B	+/-

Adjuvante Chemo- und zielgerichtete Therapie

Prädiktive Faktoren für DFS

Oxford				
Therapie	Faktor	LoE	GR	AGO
■ Adjuvante Chemotherapie	70-Gen-Signature (Mammaprint)*	1b	A	+
	21-Gen-Recurrence-Score* (Oncotype DX®)	1b	A	+
	EPclin (EndoPredict®)*	2b	B	+
	PAM-50 (Prosigna®)*	2b	B	+
	Histologischer Typ (lobulär vs. NST)	2b	B	-
	TIL's bei TNBC	2b	B	+/-
	HER2 (IHC, ISH)	1a	A	++
■ Anti-HER2-Therapie				
■ PARP-Inhibitor	gBRCA1/2 Mutation (HER2 neg.)	1a	A	+

*Entscheidung nach Alter/Menopausenstatus zu erwägen, prospektive Evidenz nur für Mammaprint und OncotypeDX verfügbar (siehe nächste Folie)



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN

Results for prospectively evaluated biomarkers (LOE1a) in early HR+/HER2- breast cancer

biomarker/ signature	Population (HR+/HER2- patients)	therapy options
Mammaprint (MINDACT n=2140)	Clinically high/genomic low risk (n=1550) N0-1, age >50 yrs N0-1, age ≤50 yrs (patients with OFS in the ET arm: 26%)	ET, no adjuvant CT adjuvant CT→ET*: 2.6% CT-benefit in 5-y DDFS (93.6 vs. 96.2%)
Oncotype DX (TAILORx n=6711)	TailorX (T1b-T2, N0, 74% clinically low risk, 13% OFS in premenopausal women) N0, RS 0-25 age>50 yrs. N0 RS 0-15 age ≤50 yrs N0 RS 16-25 age ≤50 yrs	ET, no adjuvant CHT ET, no adjuvant CHT adjuvant CT→ET*: (3.2-3.4% CT-benefit in 5-y DRFI (93→95-96% 5 y DRFI, in RS 16-20 if clinical high risk only, 16-20: HR=1.4 (n.s.), 21-25: HR=2.19 (sign) for ET vs. CT→ET
RxPonder (n=5018)	RxPonder: N1 RS 0-25: postmenopausal RS 0-25: premenopausal (patients with OFS in the ET arm: 19%)	ET, no adjuvant CT (neo)adjuvant CT→ET* 2.4% CT benefit in 5-y DRFI (5-y DRFI 93.9 vs. 96.3%, HR=0.062, p=0.02) explorative analysis: no effect of CT age 50 and older (p interaction 0.06)
RS + Ki-67post (ADAPT, n=2290 endocrine treated)	clinically intermediate/high risk , RS 0-25 (RS 12, 25+Ki67 _{post} ≤10%) N0-1, age>50 yrs N0, RS 0-11 and age ≤50 yrs N0, RS 12-25 with Ki67 _{post} ≤10% and age ≤50 yrs N1: RS 0-25 (+ Ki-67 _{post} ≤10% in RS 12-25) and age ≤50 yrs N1: RS 0-25 and ki-67 _{post} >10%	ET, no adjuvant CT adjuvant ET, no adjuvant CT adjuvant ET/- OFS, if RS >16 or clinically high risk +/- CT: 5-yr-DDFS: 97% with ET alone, no significant difference between RS 0-15 and 16-25 adjuvant ET+OFS or CT→ET 5-yrs. DDFS 97% with ET alone (neo)adjuvant CT→ET

* If CT is refused: alternative ET+OFS

DDFS=distant-disease-free-survival, DRFI= distant recurrence free interval, ET= endocrine treatment, CT= chemotherapy, OFS= ovarian function suppression, RS= Recurrence Score

Neoadjuvante Chemotherapie (NACT)

Prädiktive Faktoren für pCR I

Faktor	pCR* Wahrscheinlichkeit	Oxford		
		LoE	GR	AGO
■ Junges Alter	↑	1a	A	+
■ Adipositas	↓	2a	B	+
■ cT1 / cT2-Tumoren o. N0 o. G3	↑↑	1a	A	++
■ Negativer ER- und PR-Status	↑↑	1a	A	++
■ Triple negative (TNBC)	↑↑	1a	A	++
■ Positiver HER2-Status	↑↑	1a	A	++
■ Frühes klinisches Ansprechen	↑	1b	A	+
■ Invasives lobuläres Karzinom	↓	1a	A	+
■ Metaplastisches Karzinom	↓↓	4	C	+

* Hohe (↑) oder sehr hohe (↑↑) Wahrscheinlichkeit einer pCR, niedrigere (↓) oder sehr niedrige (↓↓) Wahrscheinlichkeit einer pCR
Siehe auch Kapitel „Prognostische und prädiktive Faktoren“

Neoadjuvante Chemotherapie (NACT)

Prädiktive Faktoren für pCR II

Faktor	pCR* Wahrscheinlichkeit	Oxford			AGO
		LoE	GR		
■ Genexpressions-Profile (Gensignaturen) (Mammaprint®, Endopredict®, Oncotype DX®, Prosigna®, Breast Cancer Index SM)	↑	2b	B	+/-	
■ Ki-67	↑	2b	B	+	
■ Tumor-infiltrierende Lymphozyten**	↑	2a	B	+	
■ PIK3CA Mutation (für HER2-positives MaCa)	↑	2a	B	+/-	
■ gBRCA Mutation (für Effekt der Chemotherapie)	↑	2b	B	+	
■ gBRCA Mutation (für Platin-Effekt)	↔	2b	B	+/-	

* Hohe (↑) oder sehr hohe (↑↑) Wahrscheinlichkeit einer pCR, niedrigere (↓) oder sehr niedrige (↓↓) Wahrscheinlichkeit einer pCR

** Definiert als dichte lymphozytäre Infiltration des inneren peritumoralen Stroma außerhalb der Invasionsfront
(Stroma besteht mit > 50 % aus Lymphozyten)



©AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN

Metastasiertes Mammakarzinom (mBC)

Prognosefaktoren

Faktor	Oxford	LoE	GR	AGO
■ Zirkulierende Tumorzellen (CTC im Blut, Cell Search®)				
■ Prognose	1a	A	A	+
■ Frühes Therapieansprechen (3 Wo.)	1b	B	B	+
■ Therapieentscheidungen basiert auf CTC-Anzahl oder CTC-Phänotypen	1b	A	A	-*
■ Cell-free DNA (cfDNA / ctDNA im Blut)	2a	A	A	+/-

* Studienteilnahme empfohlen

Metastasiertes Mammakarzinoms (mBC)

Prädiktive Faktoren für Ansprechen

Therapie	Faktor	Oxford		
		LoE	GR	AGO
■ Endokrine Therapie	ER / PR (Primärtumor, besser Metastase)	1a	A	++
	Ansprechen auf vorherige Therapie	2b	B	++
	autokrine Rezeptormutation (<i>ESR1</i>)	2b	B	+
■ Alpelisib	<i>PIK3CA</i> Mutation (Primärtumor, Metastase, Plasma)	1b	A	++
■ Trastuzumab Deruxtecan	HER2-low oder HER2-positiv	1b	A	++
■ Chemotherapie	Ansprechen auf vorherige Therapie	1b	A	++
■ Anti-HER2- Therapie	HER2 (Primärtumor, besser Metastase)	1a	A	++
■ Checkpoint-Inhibitoren	PD-L1 Positivität [#] (PD-L1ic, CPS) in TNBC (primary tumor or metastasis)	1b	B	++
■ PARP-Inhibitoren	g <i>BRCA1/2</i> -Mutation	1a	A	++
■ Bone modifying drugs	Knochenmetastasen	1a	A	++

Siehe auch Kapitel „Pathologie“



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

**FORSCHEN
LEHREN
HEILEN**

Mutationsdiagnostik* bei mBC: „Precision medicine“ für zielgerichtete Therapien

Alteriertes Gen	Therapierelevanz	Genregion	Ausgangsmaterial	Oxford		AGO
				LOE	GR	
BRCA1, BRCA2	Olaparib, Talazoparib	Alle Exons	Keimbahn: Blutzellen	1b	A	++
	Olaparib		Somatisch: Gewebe	2b	B	+/-
PALB2	Olaparib		Keimbahn: Blutzellen	2b	B	+
PIK3CA	Alpelisib	Exon 7, 9 und 20	Primärtumor, Metastasen, Plasma	1b	A	+
HER2-Mutation (unabh. vom HER2-Status)	Neratinib, Lapatinib	Kinase- und extrazelluläre Domänen; S310, L755, V777, Y772_A775dup	Primärtumor, Metastasen, Plasma; insbes. lobuläres CA	4	C	+/-
ESR1	Resistenz gegenüber AI/ Ansprechen orale SERDs	Exon 4, 7 und 8	Metastasen, Plasma	2b	B	+/-
			Metastasen, Plasma	1b	B	+/-
NTRK Genfusion	Larotrectinib, Entrectinib	Fusions- und Spleißvarianten	Tumor, bei sekretor. MammaCa	2a	B	+
MSI	Pembrolizumab	Mikrosatelliten- Instabilität	Gewebe	2a	B	+
* idealerweise Paneldiagnostik						



© AGO e. V.
in der DGGG e.V.
sowie
in der DKG e.V.

Guidelines Breast
Version 2023.1D

www.ago-online.de

FORSCHEN
LEHREN
HEILEN

Entscheidungshilfe prospektiv evaluerter Biomarker (LOE1a) und Therapieoptionen (mBC)

Biomarker / Signaturtherapieoption	Subtyp / Population	Therapieoption
PDL-L1 ≥ 1 %	TNBC	Firtst line Atezolizumab + nab Paclitaxel
CPS > 10	TNBC	First line Pembro + Chemotherapie
PIK 3CA Mutation	HR+ / HER2-	Fulvestrant + Alplisib nach Versagen der first line ET
BRCA1/2 Mutation (OlympiAD, EMBRACA)	HER2 –	Olaparib, Talazoparib

Therapierelevante Mutationsdiagnostik beim Mammakarzinom („actionable“)

Diagnostik*	Faktor	Oxford
		LoE GR AGO
Aus Studien bei anderen Karzinomen („tumoragnostische Testung“)		
▪ Companion Diagnostics Mutations bei Therapien für andere Karzinome (z. B. BRAF, FGFR1, ...)	Effektivität verschiedener Medikamente	4 D +/**
▪ Large Panel Gene Analysis (e.g. FoundationOne, GPS Cancer, NeoSelect, Molecular Health Guide, lokale „hand selected“, Panels)	Effektivität verschiedener Medikamente, Prognose	3a C +/**
▪ Next Generation Sequencing (NGS) (möglichst nur bei Tier 1 + 2)	Effektivität verschiedener Medikamente	1b B +/**

* Bestimmungsmethode somatischer Veränderungen nicht bewertet. Prinzipiell möglich aus Tumorfrischmaterial, Paraffin-Gewebe, zirkulierenden Nukleinsäuren

** Teilnahme an Studien oder strukturierten Programmen empfohlen

Joint Consensus Recommendations of AMP, ACMG, ASCO and CAP for Reporting Genetic Variants in Cancer

Tier	LoE	Explanation
Tier 1	A.1 Biomarkers that predict response or resistance to FDA-approved therapies for a specific type of cancer A.2 Biomarkers included in professional guidelines that predict response to therapies for a specific type of tumor B Biomarkers that predict response or resistance to therapies for a specific type of tumor based on well-powered studies with consensus from experts in the field	Variants of strong clinical significance
Tier 2	C.1 Biomarkers that predict response or resistance to therapies approved by the FDA or professional societies for a different type of tumor C.2 Biomarkers that serve as inclusion criteria for clinical trials D Biomarkers that show plausible therapeutic significance based on preclinical studies	Variants of potential clinical significance
Tier 3	Not observed at a significant allele frequency in the general or specific subpopulation databases, or pan-cancer or tumor-specific variant databases. No convincing published evidence or cancer association	Variants of unknown clinical significance
Tier 4	Observed at significant allele frequency in the general or specific subpopulation Databases. No existing published evidence of cancer association	Benign or likely benign variants